



Dentokain

raztopina za dlesni
tekoči ekstrakt prave kamilice/lidokainijev klorid/tinktura mire

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 1 tednu (pri vnetjih dlesni in ustne sluznice), se morate posvetovati z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo:

1. Kaj je zdravilo Dentokain in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Dentokain
3. Kako uporabljati zdravilo Dentokain
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Dentokain
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO DENTOKAIN IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Dentokain uporabljajte pri otrocih kot pomoč pri bolečih in oteklih dlesnih ob izraščanju prvih zob. Zdravilo je primerno tudi za uporabo pri odraslih za lajšanje vnetij dlesni in ustne sluznice. Raztopina za dlesni vsebuje tekoči ekstrakt kamilice, lidokainijev klorid in tinkturo mire. Tekoči ekstrakt kamilice vsebuje učinkovine, ki delujejo protivnetno, protibakterijsko in pospešujejo celjenje ran. Lidokainijev klorid lajša bolečino na mestu nanosa. Učinkovine, ki jih vsebuje tinktura mire, delujejo protibakterijsko, na površini sluznice pa tvorijo zaščitni sloj, ki pomirja razdraženo in vneto sluznico ter jo varuje pred draženjem.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO DENTOKAIN

Ne uporabljajte zdravila Dentokain

- če ste alergični na katero od sestavin zdravila ali rastline iz družine nebinovk (latinsko Asteraceae).

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 1 tednu (pri vnetjih dlesni in ustne sluznice), se morate posvetovati z zdravnikom. Dentokain ni primeren za dolgotrajno uporabo na večji površini ustne sluznice. Previdnost je potrebna ob uporabi zdravila pri hujših obolenjih srca, ledvic ali jeter. Zdravilo ne sme priti v stik z očmi; če se to zgodi, oči izpirajte z veliko količino mlačne vode. Ni za uživanje!

Druga zdravila in zdravilo Dentokain

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.

Ni poročil o medsebojnem delovanju Dentokaina z drugimi zdravili.

Odsvetujemo sočasno nanašanje Dentokaina in drugih zdravil na prizadeti predel.

Zdravilo Dentokain skupaj s hrano in pijačo

Neposredno po uporabi Dentokaina ne uživajte hrane ali pijače, da ta ne bi pospešila odstranjevanja zdravila z mesta nanosa.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Ni podatkov o varnosti uporabe Dentokaina med nosečnostjo in dojenjem.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi Dentokain vplival na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

Zdravilo Dentokain vsebuje etanol

To zdravilo vsebuje majhne količine etanola (alkohola), in sicer manj kot 100 mg na 1 odmerek.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO DENTOKAIN

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Pri vnetjih dlesni in ustne sluznice kanite 5 do 10 kapljic na konico čistega prsta ali vatirano palčko in jih nežno nanesite na boleči predel. Postopek ponovite po vsakem obroku in zvečer pred spanjem.

Uporaba pri otrocih in mladostnikih

Pri težavah z izraščanjem zob kanite 2 do 3 kapljice na konico čistega prsta ali vatirano palčko in jih nežno nanesite na bolečo dlesen. Postopek ponovite po vsakem obroku in zvečer pred spanjem.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Dentokain, kot bi smeli

Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, in se ob tem pojavijo neželeni učinki, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Preveliko odmerjanje Dentokaina lahko povzroči draženje ustne sluznice.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, ustno votlino temeljito sperite s tekočo vodo.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Dentokain

Ne uporabite dvojnega odmerka, če ste pozabili uporabiti prejšnji odmerek.

Nadaljujte z uporabo zdravila v skladu z navodilom za uporabo.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Dentokain lahko povzroči preobčutljivostne reakcije in draženje sluznice na mestu nanosa. Zdravilo vsebuje tekoči ekstrakt cvetov prave kamilice, za katero obstajajo poročila o hujših preobčutljivostnih reakcijah (pogostost ni znana).

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.

O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na nacionalni center za poročanje:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco, Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22, SI-1000 Ljubljana

telefon: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si, spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA DENTOKAIN

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Po uporabi plastenko takoj dobro zaprite.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini poleg oznake »Uporabno do:«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. VSEBINA PAKIRANJA IN DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Dentokain

1 g raztopine za dlesni (33 kapljic) vsebuje 150 mg tekočega ekstrakta prave kamilice (*Matricaria recutita* L., flos; razmerje droga : ekstrakt je 1:1; ekstrakcijsko topilo je 96-odstotni (V/V) etanol, voda in 10-odstotni (M/M) amoniak v razmerju 50:47:2,5), 5 mg lidokainijevega klorida in 4 mg tinkture mire (*Commiphora species*, tinctura).

Pomožne snovi: glicerol (E422), prečiščena voda, etanol, amoniak.

Izgled zdravila Dentokain in vsebina pakiranja

Dentokain je bistra, rumenorjava tekočina, značilnega vonja.

Pakiranje je škatla s kapalno plastenko, v kateri je 10 ml raztopine za dlesni, s priloženim navodilom za uporabo.

Način izdaje zdravila Dentokain

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah. Izdelek je galensko zdravilo.

Proizvajalec

Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj

enota Galenski laboratorij, Bleiweisova cesta 8, 4000 Kranj

telefon: 04 20 16 159, faks: 04 20 16 157, e-pošta: g.laboratorij@gorenjske-lekarne.si

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 23. 8. 2021.

