



Kapljice za inhalacijo

para za inhaliranje, raztopina
eterično olje ruševja/eterično olja evkalipta/eterično olje poprove mete

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše boleznii poslabšajo ali ne izboljšajo v 1 tednu, se morate posvetovati z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo:

1. Kaj je zdravilo Kapljice za inhalacijo in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Kapljice za inhalacijo
3. Kako uporabljati zdravilo Kapljice za inhalacijo
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Kapljice za inhalacijo
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO KAPLJICE ZA INHALACIJO IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Kapljice za inhalacijo uporabljajte za lajšanje znakov prehladnih obolenj.

To je tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.

Vdihavanje vodne pare z dodatkom Kapljic za inhalacijo vlaži sluznico dihal, blaži vnetje nosne sluznice in obnosnih votlin, redči sluz v dihalnih poteh, pospešuje njeno izločanje in lajša dihanje. Eterična olja evkalipta, ruševja in poprove mete delujejo tudi antiseptično.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO KAPLJICE ZA INHALACIJO

Ne uporabljajte zdravila Kapljice za inhalacijo

- če ste alergični na katero od sestavin zdravila, 1,8-cineol ali mentol
- če imate oslovski kašelj, bronhialno astmo ali druga obolenja, za katera je značilna preobčutljivost dihal
- v času nosečnosti in dojenja
- otroci, mlajši od 6 let
- otroci, ki so imeli v preteklosti krče (vročinske ali nevročinske).

Vdihavanje vodnih par ni priporočljivo za pljučne bolnike, pri katerih obstaja nevarnost krvavitve iz dihal.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če se znaki vaše boleznii poslabšajo ali ne izboljšajo v 1 tednu, se morate posvetovati z zdravnikom.

Ob pojavu oteženega dihanja, vročine ali gnojnega izpljunga je potreben obisk zdravnika.

Kapljice za inhalacijo ne smejo priti v stik z očmi; če se to zgodi, oči izpirajte z veliko količino mlačne vode.

Ni za uživanje!

Otroci in mladostniki

Kapljic za inhalacijo naj ne uporabljajo otroci, mlajši od 6 let, in otroci, ki so imeli v preteklosti krče (vročinske ali nevročinske).

Druga zdravila in zdravilo Kapljice za inhalacijo

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.

Ni poročil o medsebojnem delovanju Kapljic za inhalacijo z drugimi zdravili.

Zdravilo Kapljice za inhalacijo skupaj s hrano in pijačo

Ni znano, da hrana in pijača vplivata na učinkovitost Kapljic za inhalacijo.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Ne uporabljajte Kapljic za inhalacijo med nosečnostjo in dojenjem.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi Kapljice za inhalacijo vplivale na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO KAPLJICE ZA INHALACIJO

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Nakapajte 4 do 5 kapljic v posodo, v kateri je pol litra vroče vode (temperatura 50-70 °C).

Sklonite se nad posodo, glavo in posodo pokrijte z brisačo ter 10 minut globoko vdihavajte hlape skozi odprta usta ali nos.

Postopek ponovite dvakrat do štirikrat dnevno.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Kapljice za inhalacijo, kot bi smeli

Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, in se ob tem pojavijo neželeni učinki, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Vdihavanje velikih odmerkov mentola, ki je glavna sestavina eteričnega olja poprove mete, lahko povzroči omotico, zmedenost, mišično šibkost, slabost in dvojni vid.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Kapljice za inhalacijo

Ne uporabite dvojnega odmerka, če ste pozabili uporabiti prejšnji odmerek.

Nadaljujte z uporabo zdravila v skladu z navodilom za uporabo.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Kapljice za inhalacijo lahko povzročijo preobčutljivostne reakcije, draženje kože ali sluznice in dražeč kašelj.

Obstajajo poročila o pojavu motenj dihanja ter krčev bronhijev in glasilk pri občutljivih posameznikih.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.

O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na nacionalni center za poročanje:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco, Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22, SI-1000 Ljubljana

telefon: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si, spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA KAPLJICE ZA INHALACIJO

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Po uporabi stekleničko takoj dobro zaprite. Vnetljivo! Shranjujte ločeno od virov vžiga.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini poleg oznake »Uporabno do:«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. VSEBINA PAKIRANJA IN DODATNE INFORMACIJE**Kaj vsebuje zdravilo Kapljice za inhalacijo**

1 g tekočine za inhaliranje, raztopine (36 kapljic) vsebuje 450 mg eteričnega olja ruševja (*Pinus mugo* Turra, aetheroleum), 450 mg eteričnega olja evkalipta (*Eucalyptus species*, aetheroleum) in 100 mg eteričnega olja poprove mete (*Mentha x piperita*, aetheroleum). Pomožne snovi niso dodane.

Izgled zdravila Kapljice za inhalacijo in vsebina pakiranja

Kapljice za inhalacijo so bistra, skoraj brezbarvna tekočina, značilnega vonja po eteričnih oljih.

Pakiranje je škatla s kapalno stekleničko, v kateri je 50 ml pare za inhaliranje, raztopine, s priloženim navodilom za uporabo.

Način izdaje zdravila Kapljice za inhalacijo

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah. Izdelek je galensko zdravilo.

Proizvajalec

Gorenjske lekarnе, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj

enota Galenski laboratorij, Bleiweisova cesta 8, 4000 Kranj

telefon: 04 20 16 159, faks: 04 20 16 157, e-pošta: g.laboratorij@gorenjske-lekarne.si

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 20. 1. 2021.



gorenjske lekarnе