



Mazilo proti hemoroidom

rektalno mazilo

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!
Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 1 tednu, se morate posvetovati z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo:

1. Kaj je zdravilo Mazilo proti hemoroidom in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Mazilo proti hemoroidom
3. Kako uporabljati zdravilo Mazilo proti hemoroidom
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Mazilo proti hemoroidom
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO MAZILO PROTI HEMOROIDOM IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Mazilo proti hemoroidom uporabljajte pri zunanjih in notranjih hemoroidih, vnetjih kože okrog zadnjične odprtine (na primer ekcemih) in razpokah ob zadnjiku.

Pri notranjih hemoroidih lahko namesto Mazila proti hemoroidom uporabite Svečke proti hemoroidom.

Mazilo vsebuje cinkov oksid, bizmutov subgalat, tekoči ekstrakt prave kamilice, perujski balzam in lidokainijev klorid, ki lajšajo težave pri hemoroidih. Cinkov oksid in bizmutov subgalat sušita izcedek, zaščitita prizadeti predel pred draženjem ter tako spodbujata celjenje poškodovanega tkiva. Tekoči ekstrakt kamilice deluje protibakterijsko, protivnetno in pospešuje celjenje ran. Perujski balzam deluje blago antiseptično. Lidokainijev klorid lajša bolečino in blaži srbenje na mestu nanosa.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO MAZILO PROTI HEMOROIDOM

Ne uporabljajte zdravila Mazilo proti hemoroidom

- če ste alergični na katero od sestavin zdravila
- otroci, mlajši od 12 let.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 1 tednu, se morate posvetovati z zdravnikom.

Ob pojavu vročine, krvi v blatu ali znakov hujše okužbe kože je nujen obisk zdravnika.

Ob pojavu hemoroidov je nujen posvet z zdravnikom, da izključi možnost morebitnega resnejšega obolenja.

Izogibajte se dolgotrajni uporabi Mazila proti hemoroidom.

Previdnost je potrebna ob uporabi zdravila pri resnejših obolenjih srca, ledvic ali jeter.

Zdravilo ne sme priti v stik z očmi in usti; če se to zgodi, prizadete predele izpirajte z veliko količino mlačne vode.

Samo za zunanjo uporabo!

Otroci in mladostniki

Mazila proti hemoroidom naj ne uporabljajo otroci, mlajši od 12 let.

Druga zdravila in zdravilo Mazilo proti hemoroidom

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.

Do medsebojnega delovanja lahko pride ob sočasni uporabi Mazila proti hemoroidom z zdravili za zdravljenje srčnih aritmij.

Odsvetujemo sočasno nanašanje Mazila proti hemoroidom in drugih zdravil na prizadeti predel.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Ni podatkov o varnosti uporabe Mazila proti hemoroidom med nosečnostjo in dojenjem.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi Mazilo proti hemoroidom vplivalo na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

Zdravilo Mazilo proti hemoroidom vsebuje lanolin

To zdravilo vsebuje lanolin (E913), ki lahko povzroči lokalne kožne reakcije, na primer kontaktni dermatitis (vnetje kože na mestu nanosa rektalnega mazila).

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO MAZILO PROTI HEMOROIDOM

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Pri zunanjih hemoroidih nanesite Mazilo proti hemoroidom dvakrat do trikrat dnevno v tankem sloju na prizadeti predel.

Pri notranjih hemoroidih namestite na tubo nastavke za odmerjanje, ga vstavite čim globlje v zadnjično odprtino in rahlo iztisnite mazilo.

Pred uporabo mazila dobro očistite predel zadnjika.

Najbolje je, da mazilo uporabite po odvajanju blata.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Mazilo proti hemoroidom, kot bi smeli

Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, in se ob tem pojavijo neželeni učinki, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Preveliko odmerjanje Mazila proti hemoroidom lahko povzroči draženje kože.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, kožo temeljito sperite s tekočo vodo.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Mazilo proti hemoroidom

Ne uporabite dvojnega odmerka, če ste pozabili uporabiti prejšnji odmerek.

Nadaljujte z uporabo zdravila v skladu z navodilom za uporabo.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Mazilo proti hemoroidom lahko povzroči draženje na mestu nanosa in preobčutljivostne reakcije, na primer v obliki alergijskega kontaktnega dermatitisa.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.

O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na nacionalni center za poročanje:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco, Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22, SI-1000 Ljubljana

telefon: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si, spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA MAZILO PROTI HEMOROIDOM

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini poleg oznake »Uporabno do:«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. VSEBINA PAKIRANJA IN DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Mazilo proti hemoroidom

1 g rektalnega mazila vsebuje 50 mg cinkovega oksida, 50 mg bizmutovega subgalata, 50 mg tekočega ekstrakta prave kamilice (*Matricaria recutita* L., flos; razmerje droga : ekstrakt je 1:1; ekstrakcijsko topilo je 96-odstotni (V/V) etanol, voda in 10-odstotni (M/M) amoniak v razmerju 50:47:2,5), 50 mg perujskega balzama in 20 mg lidokainijevega klorida. Pomožne snovi: beli vazelin, lanolin (E913), deviško ricinusovo olje, prečiščena voda, etanol, amoniak.

Izgled zdravila Mazilo proti hemoroidom in vsebina pakiranja

Mazilo proti hemoroidom je rektalno mazilo, rjave barve, značilnega vonja.

Pakiranje je škatla z aluminijasto tubo, v kateri je 25 g rektalnega mazila, s priloženim nastavkom za odmerjanje in navodilom za uporabo.

Način izdaje zdravila Mazilo proti hemoroidom

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah. Izdelek je galensko zdravilo.

Proizvajalec

Gorenjske lekarnе, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj

enota Galenski laboratorij, Bleiweisova cesta 8, 4000 Kranj

telefon: 04 20 16 159, faks: 04 20 16 157, e-pošta: g.laboratorij@gorenjske-lekarne.si

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 20. 1. 2021.

