

Panthol losjon 5%

oralna in dermalna raztopina
dekspantenol



3932

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!
Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 1 tednu (pri vneti ali poškodovani sluznici ter kožnih poškodbah), se morate posvetovati z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo:

1. Kaj je zdravilo Panthol losjon 5 % in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Panthol losjon 5 %
3. Kako uporabljati zdravilo Panthol losjon 5 %
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Panthol losjon 5 %
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO PANTHOL LOSJON 5 % IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Panthol losjon 5 % pomaga pri vneti ali poškodovani ustni, žrelni in nosni sluznici ter manjših kožnih poškodbah, na primer blažjih sončnih in drugih opeklinah ter odrgninah. Uporabljate ga lahko tudi za masažo lasišča pri težavah z izpadanjem las.

Panthol losjon 5 % vsebuje dekspantenol, ki dobro prehaja v kožo, kjer se v kožnih celicah pretvori v pantotensko kislino (vitamin B₅). Ta spodbuja obnavljanje poškodovanega kožnega tkiva in celjenje ran, blaži vnetja, zadržuje vlago v koži ter preprečuje draženje kože.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO PANTHOL LOSJON 5 %

Ne uporabljajte zdravila Panthol losjon 5 %

- če ste alergični na katero od sestavin zdravila ali mentol
- če imate hemofilijo (bolezen strjevanja krvi).

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 1 tednu (pri vneti ali poškodovani sluznici ter kožnih poškodbah), se morate posvetovati z zdravnikom.

Panthol losjona 5 % ne uporabljajte na sveže poškodovani koži ali na okuženi rani.

Zdravilo ne sme priti v stik z očmi; če se to zgodi, oči izpirajte z veliko količino mlačne vode. Ni za uživanje!

Otroci in mladostniki

O uporabi Panthol losjona 5 % pri otrocih se posvetujte z zdravnikom.

Druga zdravila in zdravilo Panthol losjon 5 %

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.

Ni poročil o medsebojnem delovanju Panthol losjona 5 % z drugimi zdravili.

Odsvetujemo sočasno uporabo Panthol losjona 5 % in drugih zdravil na prizadetem predelu kože ali sluznice.

Zdravilo Panthol losjon 5 % skupaj s hrano in pijačo

Neposredno po uporabi Panthol losjona 5 % v ustni votlini ne uživajte hrane ali pijače, da ta ne bi pospešila odstranjevanja zdravila z mesta nanosa.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Ni poročil o škodljivih učinkih Panthol losjona 5 % med nosečnostjo in dojenjem.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi Panthol losjon 5 % vplival na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

Zdravilo Panthol losjon 5 % vsebuje propilenglikol in benzojsko kislino

To zdravilo vsebuje propilenglikol (E1520), ki lahko povzroči draženje kože, in benzojsko kislino (E210), ki blago draži kožo, oči in sluznice.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO PANTHOL LOSJON 5 %

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Panthol losjon 5 % lahko uporabljate večkrat dnevno.

Pri vnetjih in poškodbah ustne ter žrelne sluznice zdravilo grgrajte 2 do 3 minute.

Pri kožnih poškodbah nanesite zdravilo na kožo, lahko tudi v obliki obkladkov.

Zdravilo lahko uporabite tudi za izpiranje prizadetih predelov kože ali sluznice - v tem primeru lahko zdravilo razredčite z neoporečno pitno vodo v razmerju 1:1.

Pri vneti ali poškodovani nosni sluznici nanesite zdravilo na prizadeto sluznico.

Pri izpadanju las navlažite lasišče z zdravilom in ga rahlo vmasirajte; po nanosu zdravila lasišča ne izpirajte.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Panthol losjon 5 %, kot bi smeli

Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, in se ob tem pojavijo neželeni učinki, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Ni poročil o primerih prevelikega odmerjanja Panthol losjona 5 %.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, kožo ali ustno sluznico temeljito sperite s tekočo vodo.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Panthol losjon 5 %

Ne uporabite dvojnega odmerka, če ste pozabili uporabiti prejšnji odmerek.

Nadaljujte z uporabo zdravila v skladu z navodilom za uporabo.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Panthol losjon 5 % lahko povzroči koprivnico, draženje kože ali sluznice. Lahko se pojavijo preobčutljivostne reakcije, tudi na dihalih, predvsem pri osebah z aspirinsko astmo.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.

O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na nacionalni center za poročanje:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco, Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22, SI-1000 Ljubljana

telefon: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si, spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA PANTHOL LOSJON 5%

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini poleg oznake »Uporabno do:«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. VSEBINA PAKIRANJA IN DODATNE INFORMACIJE**Kaj vsebuje zdravilo Panthol losjon 5 %**

1 g oralne in dermalne raztopine vsebuje 50 mg dekspantenola.

Pomožne snovi: prečiščena voda, propilenglikol (E1520), polisorbitat 20 (E432), benzojska kislina (E210), eterično olje poprove mete.

Izgled zdravila Panthol losjon 5 % in vsebina pakiranja

Panthol losjon 5 % je bistra, brezbarvna tekočina, značilnega vonja po eteričnem olju poprove mete in značilnega okusa.

Pakiranje je škatla s steklenico, v kateri je 100 ml oralne in dermalne raztopine, s priloženim navodilom za uporabo.

Način izdaje zdravila Panthol losjon 5 %

Izdaja zdravila je na recept in brez recepta v lekarnah. Izdelek je galensko zdravilo.

Proizvajalec

Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj

enota Galenski laboratorij, Bleiweisova cesta 8, 4000 Kranj

telefon: 04 20 16 159, faks: 04 20 16 157, e-pošta: g.laboratorij@gorenjske-lekarne.si

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 30. 9. 2020.



gorenjske lekarnice