

Praški proti bolečinam

peroralni praški
paracetamol/propifenazon/kofein



4023

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!
Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 3 dneh, se morate posvetovati z zdravnikom.

- Kaj vsebuje navodilo:**
1. Kaj je zdravilo Praški proti bolečinam in za kaj ga uporabljamo
 2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Praški proti bolečinam
 3. Kako uporabljati zdravilo Praški proti bolečinam
 4. Možni neželeni učinki
 5. Shranjevanje zdravila Praški proti bolečinam
 6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO PRAŠKI PROTI BOLEČINAM IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Praške proti bolečinam uporabljajte za lajšanje bolečin, kot so glavobol, zobobol, menstrualne bolečine, bolečine pri poškodbah, bolečine po zdravniških in zobozdravniških posegih, bolečine v mišicah in sklepih (na primer revmatske bolečine). Zdravilo lahko uporabljate tudi za lajšanje bolečin in zniževanje zvišane telesne temperature pri gripi in prehladnih obolenjih. Paracetamol in propifenazon lajšata bolečine in znižujeta zvišano telesno temperaturo. Kofein ima spodbujevalni učinek na organizem.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO PRAŠKI PROTI BOLEČINAM

Ne uporabljajte zdravila Praški proti bolečinam

- če ste alergični na katero od sestavin zdravila
- če imate hujše motnje delovanja jeter ali ledvic, porfirijo (redka presnovna bolezen), pomanjkanje encima glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze (redka dedna bolezen rdečih krvničk)
- v času nosečnosti in dojenja
- otroci, mlajši od 12 let.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 3 dneh, se morate posvetovati z zdravnikom.

Ob pojavu oteženega dihanja, vročine ali gnojnega izpljunga pri prehladnih obolenjih ter otekanja bolečih predelov, rdečine ali vročine pri bolečinah v mišicah in sklepih je nujen obisk zdravnika.

Posebna previdnost je potrebna ob uporabi Praškov proti bolečinam pri motnjah v delovanju jeter ali ledvic, okvari kostnega mozga, Gilbertovem sindromu (redka dedna presnovna bolezen), bronhialni astmi, kroničnem nahodu ali koprivnici (zlasti ob preobčutljivosti za druge protivnetne učinkovine, na primer acetilsalicilno kislino), hemolitični anemiji (slabokrvnost zaradi povečanega razpada rdečih krvnih celic), odvisnosti od alkohola, kronični podhranjenosti in dehidriranosti.

Dolgotrajno jemanje zdravil za lajšanje glavobola lahko privede do kroničnega glavobola.

Dolgotrajno jemanje velikih odmerkov zdravil za lajšanje bolečin lahko trajno poškoduje ledvice in jetra.

Zdravilo znižuje zvišano telesno temperaturo, kar lahko prikrije okužbo.

Zdravilo lahko povzroči nepravilne rezultate nekaterih testov določanja sladkorja in sečne kisline v krvi.

Otroci in mladostniki

Praškov proti bolečinam naj ne uporabljajo otroci, mlajši od 12 let..

Druga zdravila in zdravilo Praški proti bolečinam

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.

Praškov proti bolečinam ne smete jemati hkrati z drugimi zdravili, ki vsebujejo paracetamol ali propifenazon.

Do medsebojnega učinkovanja lahko pride ob sočasni uporabi Praškov proti bolečinam z naslednjimi zdravili oziroma učinkovinami: druga nesteroidna protivnetna in protirevmatična zdravila, zdravila z učinkom na jetra in jetrne encime, zdravila za zdravljenje epilepsije (fenitoin, fenobarbital, karbamazepin, lamotrigin, primidon), zdravila proti strjevanju krvi (varfarin in drugi derivati kumarina), zdravila za zdravljenje prebavnih motenj (domperidon, metoklopramid, proprantelin), antibiotiki (izoniazid, flukloksacilin, kloramfenikol, rifampicin), antihistaminiki, peroralne kontracepcijske tablete, simpatomimetiki, triciklični antidepressivi, uspavalna, zaviralci giraze, cimetidin, disulfiram, holestiramin, interferon alfa, levotiroksin, probenecid, teofilin, zidovudin.

Zdravilo Praški proti bolečinam skupaj s hrano in pijačo

V času jemanja Praškov proti bolečinam ne pijte alkoholnih pijač in omejite vnos kofeina.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Ne uporabljajte Praškov proti bolečinam med nosečnostjo in dojenjem.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi Praški proti bolečinam vplivali na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO PRAŠKI PROTI BOLEČINAM

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Vzamete lahko 1 prašek na 4 do 6 ur.

Največji dnevni odmerek so 4 praški.

Vsebino papirnate kapsule stresite v pol kozarca vode (1 dl), premešajte in popijte, najbolje po jedi.

Zdravilo jemljite največ 3 dni zapored.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Praški proti bolečinam, kot bi smeli

Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, in se ob tem pojavijo neželeni učinki, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Ob zaužitju prevelikega odmerka Praškov proti bolečinam se takoj posvetujte z zdravnikom, saj se znaki lahko pojavijo šele čez nekaj dni. Znaki zaužitja prevelikega odmerka zdravila so slabost, bruhanje, pomanjkanje apetita, zaspanost, potenje, krči, hitro utripanje srca, koma in drugi. Prvi znak okvare jeter, ki je smrtno nevarna in se pojavi po 1 do 2 dneh ali še kasneje, je trebušna bolečina.

Dolgotrajno jemanje prevelikih odmerkov zdravila lahko povzroči resno okvaro jeter ali ledvic.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Praški proti bolečinam

Ne uporabite dvojnega odmerka, če ste pozabili uporabiti prejšnji odmerek.

Nadaljujte z uporabo zdravila v skladu z navodilom za uporabo.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Zdravniška pomoč je nujna ob pojavu naslednjih neželenih učinkov Praškov proti bolečinam: pojav rdečice na koži, izpuščaje, mehurjev ali luščenja kože, resne kožne reakcije (Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza, akutna generalizirana eksantemska pustuloza).

Zelo redek neželeni učinek je takojšnja preobčutljivostna reakcija (anafilaktična reakcija), ki je lahko tudi smrtno nevarna in zahteva takojšnjo zdravniško pomoč; kaže se kot otekanje obraza, ustnic, vratu ali grla, kar lahko povzroči težave pri požiranju ali dihanju, astmatični napad, potenje, padec krvnega tlaka, ki se stopnjuje do šoka.

Občasno se lahko pojavijo kožne preobčutljivostne reakcije (izpuščaji, koprivnica, srbenje). Obstajajo poročila o zmanjšanju števila nekaterih vrst krvnih celic (na primer krvnih ploščic, belih in rdečih krvnih celic). Lahko se pojavijo motnje v delovanju ledvic in jeter, depresija, omotica, halucinacije, tresenje, glavobol, zamegljen vid, bolečine v trebuhu, driska, slabost, bruhanje, utrujenost, zvišana telesna temperatura, nizke koncentracije sladkorja v krvi, bronhospazem (stiskanje dihalnih poti zaradi mišičnih krčev pri osebah, občutljivih na acetilsalicilno kislino ali druga nesteroidna protivnetna in protirevmatična zdravila).

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.

O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na nacionalni center za poročanje:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco, Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22, SI-1000 Ljubljana

telefon: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si, spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA PRAŠKI PROTI BOLEČINAM

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! Shranjujte na suhem mestu, pri temperaturi do 25 °C.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojninii poleg oznake »Uporabno do:«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjinske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. VSEBINA PAKIRANJA IN DODATNE INFORMACIJE**Kaj vsebuje zdravilo Praški proti bolečinam**

1 peroralni prašek vsebuje 300 mg paracetamola, 200 mg propifenazona in 50 mg kofeina. Pomožna snov: lahki magnezijev oksid (E530).

Izgled zdravila Praški proti bolečinam

Praški proti bolečinam so praški, bele barve.

Pakiranje je škatla, v kateri je 10 peroralnih praškov v papirnatih kapsulah, s priloženim navodilom za uporabo.

Način izdaje zdravila Praški proti bolečinam

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah. Izdelek je galensko zdravilo.

Proizvajalec

Gorenjske lekarnе, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj

enota Galenski laboratorij, Bleiweisova cesta 8, 4000 Kranj

telefon: 04 20 16 159, faks: 04 20 16 157, e-pošta: g.laboratorij@gorenjske-lekarne.si

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 21. 9. 2020.



gorenjske lekarnе